



DIRECTOR-PROPIETARIO, D. FRANCISCO DE A. DARDER Y LLIMONA.

PRECIOS DE SUSCRICION:— En toda España, 3 pesetas trimestre.—Extranjero, 8 pesetas semestre.—América, 20 ptas. año. A los suscritores de fuera de Barcelona se les admitirá en pago sellos de correo ó libranzas del giro mútuo. *Dejarán de servirse las suscripciones, cuyo importe no se satisfaga por adelantado.*—Para las suscripciones y anuncios, dirigirse á la Administracion, calle de Mendizábal, núm. 20, piso 2.º, Barcelona.—Horas de oficina, todos los días laborables de 2 á 4.

ESTERIOR DEL CABALLO.

Ijares.

Los ijares tienen por base principal la porcion carnosa del músculo ilio-abdominal; no es mas que una prolongacion del vientre entre las costillas y la cadera hasta los riñones.

Tres son las partes que ofrece á la consideracion: la una media oblícua formada por el músculo precitado y designado con el nombre de *cuerda del ijar*; la segunda encima de la precedente, forma el *hueco del ijar*; y finalmente la tercera situada debajo de la cuerda, se confunde con el vientre.

El caballo en buena salud y en un estado medio de gordura, tiene la cuerda del ijar poco saliente y el hueco se manifiesta poco; cuando está el caballo en buen estado de gordura, los ijares están al nivel de las regiones circunvecinas. En los caballos flacos y en aquellos que han sufrido grandes fatigas, ó prolongadas enfermedades, la cuerda se manifiesta en su grado máximo y se dice que tienen el ijar *encordado*. En los caballos blandos para el trabajo y de vientre caído, el ijar naturalmente se les presenta hueco. El ijar de galgo acompaña siempre la retraccion del vientre, al cual hemos dado ya una denominacion análoga.

La longitud del ijar se mide desde la última costilla al ángulo de la cadera, y está en la misma razon que los riñones, dando lugar á las mismas consideraciones.

Los movimientos del ijar exigen un sério exámen en la eleccion de un caballo. Por medio de ellos se conoce el estado de los órganos de la respiracion, sin cuya integridad el animal pierde todo su valor.

Cuando el caballo se halla en buen estado de salud y ha descansado por algun tiempo, los ijares efectuan movimientos regulares é iguales de elevacion y de presion correspondientes á los de inspiracion y espiracion, y separados de tiempo en tiempo por movimientos mas grandes que no deben tomarse como sintomas de un estado enfermizo.

Este movimiento de acelera en razon de la velocidad y del tiempo que el caballo ha estado en ejercicio; y el caballo es tanto mejor cuanto mas pronto los ijares vuelven á tomar su movimiento natural. Hay caballos que despues de una carrera ligera tienen los ijares agitados y se dicen *cortos de aliento* ó de *resuello*.

Este defecto se observa muy particularmente en los caballos estrechos de pecho.

Los movimientos de los ijares pueden presentar muchas alteraciones, indicando diferentes enfermedades agudas del pecho, y son de un grande auxilio para el diagnóstico; pero la alteracion que mas nos importa examinar, pertenece á un estado patológico, cuyo punto de residencia es poco conocido aun, y acostumbra á designársele con el nombre de *sobresalto* ó *asma*.

En los ijares del caballo *asmático*, el movimiento de compresion ó de aspiracion se verifica en dos tiempos; es decir, que se interrumpe por un ligero movimiento de elevacion que constituye el *sobresalto* ó el *latigazo*, considerado como el carácter del asma. Este estado de los ijares es difícil de reconocer, aun para los que tienen mucha práctica, cuando el sobresalto no está bien pronunciado; de modo que antes de emitir nuestra opinion, debe someterse el animal á un exámen minucioso y muy prolongado.

Desde luego se examina el caballo descansado al salir de la cuadra, tomando la precaucion de alejarle todo lo que puede inquietarle, y sobre todo los objetos que pudiese oler.

El que debe reconocer al caballo, no se coloca de frente al ijar; sino delante ó detrás para que dirigiendo oblícua-mente la visual, puedan observarse mejor los movimientos. Es bueno examinar ambos lados, puesto que los movimientos no son semejantes por causa de las diferentes víceras que tienen próximas.

Si el movimiento parece regular ó queda alguna incertidumbre, se hace andar al animal durante algun tiempo, y se procede á un nuevo exámen. La respiracion acelerada por el ejercicio puede hacer que se reconozca el sobresalto mas fácilmente.

Para estar aun mas seguro de que la atencion del animal está completamente desviada de cualquiera objeto que pudiese agitarle; puede observársele, tambien, mientras come el pienso, sea antes ó despues del ejercicio.

Los caballos asmáticos están afectados de una tos frecuente y seca. Algunas veces sale de sus narices un moco pegajoso, límpido y poco abundante. Cuando el asma ha llegado á cierto grado, las alas de las ventanas de la nariz constantemente están separadas, como si el caballo acabase de efectuar una carrera rápida.


La frecuente expulsion de gases por el ano ocasionada á los caballos asmáticos por los esfuerzos de la tos, ha hecho imaginar á los albeítas ignorantes el *ruiseñor* ó *silvato*, fistula artificial que practicaban en el ano, por cuyo medio querian desembarazarles de la gran cantidad de aire que tenían

dentro el cuerpo. En el día esta operacion ridícula, que en otros tiempos anulaba la accion redhibitoria de los caballos á los cuales se habia practicado, ha quedado abandonada por completo, y el asma está por lo tanto comprendida en el grupo de los vicios redhibitorios.

Vientre.

Situado entre la cinchera, los costillares y los ijares, el vientre tiene por base los músculos de las paredes inferiores del abdómen.

Su desarrollo debe ser regular. Cuando es demasiado voluminoso se le llama *vientre caído*; ó *vientre de vaca*, si el defecto es extremado. Generalmente los caballos ensillados tienen el vientre caído á consecuencia de la flexion de la columna dorso lumbar. Lo mismo sucede con los caballos de costillar plano ó aplastado, cuyo pecho muy reducido echa hácia atrás las vísceras abdominales. El vientre de vaca indica un caballo blando para el trabajo, muy comedor y poco á propósito para marchas rápidas, á causa de su masa y de su escaso aliento. En efecto, levantándose las costillas á cada movimiento respiratorio, deben hacer subir la masa intestinal que soportan por sus extremidades, y el movimiento de elevacion se ejecuta con tanto mayor trabajo, cuanto mas desarrollado está el vientre y mayor es la resistencia que opone. El vientre de la yegua que ha parido, siempre queda mas voluminoso que antes de la gestacion, esceptuando sin embargo el de la yegua de carrera.



Vientre de galgo.

Cuando, por el contrario, el caballo tiene el vientre muy poco desarrollado, vulgarmente se le llama *estrecho de tripas*. Si el vientre está muy apretado, sobre todo hácia los costados, se llama *vientre de galgo* ó *vientre retorcido*. Con la mayor frecuencia estos dos defectos indican que el caballo habitualmente ha estado mal alimentado, ó que durante mucho tiempo ha experimentado grandes sufrimientos.

Por otra parte, el género de alimentos con que se nutre, influye mucho en el desarrollo del vientre, tanto mas cuanto mayor es la proximidad á la época del nacimiento. Así vemos que el caballo de tiro que desde su tierna edad se le alimenta con forrajes, presenta un vientre de galgo, que nunca debe confundirse con un estado semejante proveniente de sufrimientos ó de una alimentacion insuficiente.

Hácia la parte posterior del vientre y sobre su línea media, existe una cicatriz, resultado de la desaparicion de la abertura umbilical; en este punto es donde se encuentra la *hernia umbilical*; tumor blando, mas ó menos desarrollado, producido por el paso de una porcion del intestino delgado ó del epiplon al través del anillo umbilical, cuya abertura ha persistido. Esta hernia, que desde la primera edad se manifiesta, amenudo desaparece con el desarrollo del animal; y cuando persiste, puede quitársele por medio de una operacion muy sencilla.

En diferentes puntos del vientre, pueden existir otras hernias producidas por los golpes ó por los grandes esfuerzos. Su gravedad está en razon de su volúmen; pero en todos los casos siempre es temible su aumento con los esfuerzos ó con la *estrangulacion* de la porcion de intestino.

El *edema*, infiltracion serosa de la parte en que el vientre tiene mas declive, muchas veces es el resultado de un re-

poso prolongado por demasiado tiempo, ó de la proximidad del parto en la yegua. Tambien se encuentra en los caballos débiles y extenuados. Es preciso asegurarse siempre con mucho cuidado de la causa que lo produce. Fácilmente se distingue de cualquiera otro tumor, porque conserva durante cierto tiempo la impresion del dedo cuando se le comprime.

Costillar.

Se da el nombre de costillar á la region que tiene por base todas las costillas que no se hallan ocultas por la espalda. Está limitada por la espalda, los ijares, el dorso y el vientre.

El costillar del caballo debe ofrecer una convexidad bastante pronunciada.

El costillar aplanado, generalmente es indicio de poco aliento en el caballo; en este caso la cavidad del pecho tiene poca extension, á menos que esté compensada por una grande altura, como se ve en los caballos ingleses destinados á carreras, que siempre tienen el costillar algo aplanado. El costillar aplanado y corto, casi siempre va acompañado de un vientre voluminoso.

Por el contrario, un costillar *arqueado* anuncia un pecho ancho y capacidad para resistir los ejercicios mas violentos; de modo que siempre es una belleza, con tal de que su convexidad no sea excesiva.

El movimiento que ejecutan las costillas durante el acto de la respiracion, demuestra, además, que la costilla plana no puede dilatarse tanto como la arqueada para engrandecer el pecho. En efecto, el pecho se dilata por un movimiento que lleva hácia fuera la convexidad de la costilla, vuelta antes hácia atrás; de ahí resulta, pues, que una costilla arqueada con su cambio de direccion, debe aumentar el diámetro mucho mas de lo que lo haria una costilla que tuviera menos convexidad.

Algunas veces en los puntos donde se coloca la silla ó el sillón, las costillas presentan tumores duros, mas ó menos voluminosos. Aunque estos tumores á veces son insensibles, no obstante hacen sufrir al animal, transmitiendo á los tejidos las presiones que experimentan.

Si son muy voluminosos y se descuidan, pueden producir úlceras graves de lenta curacion, sobre todo si se complican con las cáries de la costilla, como sucede algunas veces.

No deben confundirse estos tumores con otros mas duros que se encuentran en las costillas, principalmente en los posteriores, los cuales son consecuencia de alguna fractura.

Un espacio desprovisto de pelos en las costillas próximo á la cinchera, indica que sobre este punto se ha aplicado un vejigatorio para combatir alguna enfermedad grave del pecho.

Cuando á consecuencia de una enfermedad cualquiera, un caballo, jóven todavía, permanece echado por mucho tiempo, de un mismo lado, se deprime, se aplasta sensiblemente y esta deformidad que ya no se corrige jamás, es casi siempre un indicio de debilidad y de su predisposicion para diversas afecciones.

Cinchera.

Se halla situada á continuacion de la interaxila y del codo, delante del vientre. En esta region se forma algunas veces una excoriacion ocasionada por el roce de la cincha que puede impedir por muchos dias el uso de la silla. Esta herida se cura muy pronto suprimiendo la causa de donde proviene.

Inter axila.

Con este nombre se conoce el espacio situado entre los dos remos comprendido muy amenudo con el pecho, del cual no es mas que una continuacion. Podrá ser ancho ó estrecho segun la conformacion del pecho.


Axilas.

Las axilas separan el pecho del antebrazo. En este punto la piel presenta numerosos pliegues por causa de los movimientos frecuentes y estendidos que se verifican en esta region. Algunas veces la introduccion del polvo entre los pliegues sobre todo en épocas calurosas, origina la escoriacion de la piel, que cuando no degenera en una afeccion herpética se cura con facilidad.

Pecho.

El pecho está colocado debajo el borde inferior del cuello, y entre los dos ángulos de las espaldas; tiene por base la parte anterior del esternon y los músculos voluminosos que desde este hueso se dirigen á los miembros anteriores.

Su anchura está en razon directa de la que tiene la parte posterior. Un pecho ancho indica gran capacidad de la cavidad torácica y por consiguiente una respiracion prolongada. De ella resulta mas fuerza y mayores alientos en el animal; pero hallándose los miembros separados uno de otro por causa de la misma anchura, le hacen menos propósito para los movimientos vivos y rápidos. Por esta razon deben buscarse pechos muy anchos, tan solo para los caballos destinados á arrastrar al paso grandes pesos. Cuanto mas se necesite que los movimientos se aceleren, tanto mas estrecho deberá ser el pecho; y en ciertos caballos, como los ingleses, por ejemplo, esta disminucion de anchura queda compensada con un aumento de altura que deja al animal con toda su fuerza de respiracion, adoptándose su conformacion todo lo posible á la rapidez de movimientos que se exige.



Ancho de pechos.

Estrecho de pechos.

Para cualquier servicio deberán desecharse siempre los caballos de pecho muy estrecho, como los hay que parece que se les juntan las espaldas. Un caballo de esta conformacion siempre es malo para el servicio; no puede soportar la fatiga, en las marchas rápidas pierde el aliento, y se ha observado que los caballos de pecho estrecho, y ante brazo delgado, están mas expuestos que los otros á las afecciones agudas y crónicas de los órganos respiratorios.

En los caballos que han sufrido á consecuencia de las fatigas, por enfermedades ó por causa de mala alimentacion, los músculos adelgazados dejan en descubierto el esternon que hace el pecho cortante.

Muchas veces en los caballos viejos cuyas estremidades anteriores están arruinadas, el pecho presenta tambien un hueco, debido á que el ángulo de la espalda se ha hecho mas agudo con la continuacion de inclinar todo el cuerpo hácia delante.

Pocas son las enfermedades particulares que presenta el

pecho. Las señales que algunas veces tienen de sedales, no deben causar ningun temor en la compra de un caballo, porque muchas veces se aplican como una medida de precaucion, aunque no padezcan enfermedad alguna.

ÓRGANOS GENITALES DEL MACHO.**Testículos.**

Los testículos, en número de dos, están colocados en la region inguinal, delante del púbis, y van encerrados en un saco membranoso llamado *bolsas*; en la primera edad de los potros, las bolsas están vacías, y los testículos no empiezan á descender hasta fines del primer año.

Es importante asegurarse de la integridad de los testículos, no solo en los animales destinados á la reproduccion, sino tambien en todos los caballos enteros, aunque no se destinen para la monta; siempre deben examinarse estos órganos con el mayor cuidado, porque el caballo no es *entero* en realidad, y con este título no goza de toda su fuerza, sino cuando sus testículos tienen su desarrollo normal y se hallan en estado de perfecta salud.

Los testículos bien desarrollados anuncian la fuerza; los caballos árabes y berberiscos los tienen voluminosos. No deben colgar demasiado; esta disposicion en las razas ordinarias, indica debilidad. Su retraccion constante hácia el anillo inguinal, es un indicio de dolores abdominales; pero esta retraccion no debe confundirse con la que ocasiona el frio arrugándoles al mismo tiempo las bolsas.

En todos los casos, los testículos deben estar libres en su desarrollo y escapar bajo la presion de la mano.

Las bolsas deben ser finas sin obstrucciones.

Los testículos ó sus envolturas están sujetos á un gran número de enfermedades.

Se llama *sarcocoele* un desarrollo mas ó menos considerable del órgano, que puede llegar á hacerse muy voluminoso. En ese estado, con su peso y sus movimientos embaraza la marcha del animal y le causa vivos dolores al mismo tiempo con los tirones que le da el cordon.

Otras veces, por el contrario, los testículos están atrofiados, blandos y se adhieren á sus envolturas. Un caballo atacado de esta enfermedad, no solo debe desecharse para los puestos de parada, sino para todos los servicios en que se necesite un caballo entero; la atrofia priva al animal de una parte de su fuerza.

Se encuentran algunos caballos enteros que no tienen mas que un solo testículo, y hasta los hay que parecen completamente privados de ellos. Esta conformacion es debida á un impedimento al descenso del órgano que no ha podido salvar el anillo inguinal. Los animales de esta clase, ordinariamente son muy vivos, muy dados al acto de la generacion, y casi siempre malos é indóciles.

Las bolsas pueden contener una cantidad de serosidad que se designa con el nombre de *hidrocele*. Se reconoce su presencia por el desarrollo de las envolturas, su aspecto reluciente y estendido, y por la imposibilidad que hay de coger el testículo retraido hácia el anillo. La hidropesía en las bolsas es un defecto grave, y tanto mas temible, cuando esta afeccion coincide con un principio de hidropesía abdominal.

En vez de serosidad, las bolsas pueden encerrar una asa de intestino delgado que ha atravesado el anillo testicular. Esta afeccion conocida con el nombre de *hernia inguinal*, ó *hernia testicular*, debe hacer desechar el animal, porque de un momento á otro la hernia puede estrangularse y producir su muerte. La hernia puede ser *intermitente* y entonces pasa á ser un vicio redhibitorio.

Se designa con el nombre de caballo *capon* ó *castrado* al que se le ha privado de los testículos por medio de la castracion.

Deben examinarse con mucha atencion las bolsas del caballo castrado, sobre todo si es jóven, y por consiguiente se halla en la edad en que se les practica esta operacion.

Algunas veces, en la extremidad del cordón sobreviene una obstrucción fungosa que se ensancha y constituye lo que se llama un hongo. Esta enfermedad exige una operación que no siempre sale bien; el hongo entonces es reemplazado por una obstrucción inflamatoria en el cordón testicular, en el cual se desarrolla una fístula profunda que produce una gran cantidad de pus. El animal sufre mucho; enflaquece y amenudo acaba por perecer.

Otras veces, se encuentra en las bolsas una fístula estrecha de la cual fluye un pus mas ó menos abundante. Esta fístula, aunque mucho menos peligrosa que la precedente, amenudo proviene de una ligadura que ha permanecido unida al cordón, y puede quitarse fácilmente dilatando la abertura.

En todos estos casos es fácil limpiar y secar la mayor parte de las fístulas en el momento de poner en venta el animal, para engañar al comprador poco atento que no se fija en todos los detalles que debe apreciar.

Prepucio.

El prepucio es el repliegue de la piel en que se halla alojado el miembro en su estado de flexidez. Además de la piel fina y sin pelos que la constituye, está sostenida por otras producciones fibrosas amarillas unidas á la túnica abdominal. Su cavidad está humedecida por un humor sebáceo, gris negruzco, que á causa de su aspecto, se le llama *unto de rueda*.

El prepucio en el caballo, y sobre todo en el asno, tiene en cada lado un pegon que representa el mismo órgano en la hembra.

Para estar bien conformado el prepucio, debe ser ancho; y siempre lo es en los caballos enteros. Pero en los caballos castrados algunas veces es tan estrecho, que el animal no puede hacer salir el miembro para orinar. De ahí resulta una secreción mas ó menos abundante de las glándulas sebáceas irritadas por la orina, y la producción de ulceraciones difíciles de curar, que pueden propagarse al miembro.

El prepucio estrecho casi siempre va acompañado de un vientre de galgo. Los animales de vientre caído algunas veces presentan el defecto opuesto.

Miembro.

En la elección de los caballos destinados para la reproducción, debe tenerse un particular cuidado para asegurarse del buen estado del miembro. Entre esos animales, lo mismo que en los caballos castrados, puede estar lleno de verrugas ó ulceraciones que perjudican sus funciones; y el caballo semental puede trasmitirlas á la yegua.

Algunas veces está atacado de una especie de parálisis; cuelga fuera del prepucio y con la marcha del animal se mueve en todas direcciones. Además de ser un defecto muy desagradable á la vista, la *caída del miembro*, incomoda mucho al caballo en sus movimientos.

El miembro debe siempre aparecer en la entrada del prepucio y salir de el, en parte, cuando emite la orina.

ÓRGANOS GENITALES DE LA HEMBRA.

Vulva.

La vulva es el orificio externo del aparato genital y urinario de la hembra ó de la yegua. Constituye una hendidura vertical situada debajo del ano, del cual está separada por el perineo.

Ofrece dos labios y dos comisuras.

Los labios son redondeados; están arrugados transversalmente, y se hallan cubiertos de una piel fina desprovista de pelos. Los labios deben cerrar exactamente la abertura de la vulva. Los pliegues en su parte externa indican que la yegua ha parido; y su número y extensión aumenta con los partos.

La comisura superior termina en ángulo agudo y no presenta nada notable.

La inferior está redondeada y si se separan un poco los labios que la forman, se ve el clítoris, grande tubérculo que está situado en un hundimiento.

La vulva puede presentar verrugas ó callos, los cuales hacen que la yegua que los tiene, sea excluida de los puestos de monta, porque este vicio debe considerarse como hereditario.

Mamas.

Las *mamas* ó *tetas* están situadas en la región inguinal. En la yegua que no ha parido, apenas son perceptibles, durante el período de lactancia, es cuando toman su desarrollo, y entonces forman dos eminencias separadas una de otra por un surco y terminadas cada una de ellas por un pezon aplastado; cada pezon está atravesado por dos aberturas que corresponden la una á la parte anterior de la mama y la otra á la posterior. Las mamas de la yegua raras veces presentan endurecimientos y escirros; pero la abundancia de los linfáticos en esas glándulas hace que cuando se desarrollan los lamparones, frecuentemente se vean atacadas de esta enfermedad.

F. L.

TOROS DE MORUVE.



Insiguendo el sistema que adoptamos en el año anterior, nos abstendremos de publicar las revistas de las corridas de toros que se celebren en esta capital durante la presente temporada, teniendo para ello en cuenta que perdería aquel trabajo toda oportunidad si, como no podría menos de suceder, apareciera en nuestro periódico después de haberse ocupado del mismo asunto los demás colegas de la localidad. Nos limitaremos, pues, á comunicar á nuestros lectores, como lo hemos verificado constantemente, todas cuantas noticias podamos adquirir sobre ganaderías, y las demás referentes al arte taurómico que puedan ofrecer algún interés y novedad á nuestros abonados, dando principio á nuestra tarea con la inserción de algunos datos referentes á la vacada de donde proceden los bichos que deben lidiarse hoy en la Plaza de Toros de esta ciudad.

En 1862 fundó la ganadería que lleva el nombre con que hemos encabezado estas líneas, D. Antonio Moruve, com-



¡A LOS TOROS!

prando casi la totalidad del ganado que poseía D. Manuel Suarez, de Coria del Rio, y una parte de las tres en que se dividió la de D. José Arias de Saavedra, vecino de Utrera. A esta hábil union de castas, que llegaron á ser las mas famosas de Andalucía, débese que actualmente los toros de Moruve reunan excelentes condiciones para la lidia y estén dotados de una conformacion y corpulencia competentes con la ligereza, empuje y nobleza que les distinguen. Así, pues, para los ginetes son dichos toros duros y de cabeza, y para los peones, nobles y bravos, que es cuanto se puede exigir.

Córrense de 50 á 60 todos los años en las varias provincias de España y su precio suele ser siempre elevado; el pelo de aquellos animales es generalmente cárdeno, colorado y negro, y usan como distintivo divisa encarnada y negra, por

mas que en carteles y en revistas se diga que la constituyen el rosa y blanco, derivando sin duda semejante diferencia de que Saavedra adoptaba para sus reses los colores blanco y celeste, y Suarez, rosa y blanco.

Actualmente la ganadería de Moruve pertenece á la viuda de éste, D.^a María de los Dolores Monge, vecina de Sevilla, quien procura con especial esmero que conserven tan excelentes toros la fama y crédito que justamente han alcanzado.

Terminaremos esta reseña dando á conocer, para demostrar la nobleza de los tales cornúpetos, las pocas cogidas que han ocasionado durante el largo período de 14 años, así como sus hechos [mas notables, por orden correlativo de fechas.

El año 1869, en Cádiz, cuando Cara-ancha, que hoy se halla al frente de una de las cuadrillas que deben lidiar en esta plaza, no era mas que banderillero, fué herido en el rostro en el preciso momento de poner un par de banderillas.

En el día 27 de Abril de 1872, el toro *Tiñoso* dió al Tato un puntazo en el hueso del izquierdo.

En la tarde del 11 de Agosto siguiente, en Jerez de la Frontera, el picador Manuel Gallardo fué derribado en la suerte de vara por el cuarto toro, sufriendo una cornada en el muslo derecho.

En la corrida celebrada en Madrid el 13 de Octubre del referido año, el toro denominado *Barcelon* fué el primero de salida, y debiendo matarlo Cayetano Sanz, primer espada entonces, dió éste la alternativa á Angel Fernandez Valdemoro.

En Sevilla, en el año 1873, Hipólito Sanchez, al intentar dar muerte recibiendo, al tercer toro de la corrida, fué cogido con tan mala suerte que el bicho le hirió en el muslo interesándole el bajo vientre.

El 24 de Mayo de 1874, en Madrid, recibió un puntazo en el cuello Cirineo en el momento que este diestro pasaba de muleta al bicho, cuyo nombre era *Rompelindos*. El matador habia recibido la alternativa de Frascuelo.

Estas son todas las noticias que hemos recogido acerca del ganado perteneciente á la ganadería de Moruve, esperando que los toros de la misma procedencia que han de lidiarse esta tarde en la Plaza de Barcelona, y cuyos nombres y reseñas publicamos en la seccion de anuncios, han de dejar complacidos, por su bravura y excelentes condiciones, á los aficionados á esta clase de espectáculos.

VARIEDADES.

Don Enrique Saumell ha adquirido el airoso caballo Capuchino por la cantidad de 20,000 rs. La reseña de este animal es como sigue: Entero, castaño encendido, entrepelado de ijares, calzado del izquierdo, 6 años, 7 cuartas, 7 dedos con hierro de la acreditada ganadería de los Sres. Romero hermanos, que tiene la figura de un corazon con una pequeña línea en el lado izquierdo.

Capuchino es hijo de *Podenco*, caballo de D. Vicente Romero, que usaba como distintivo el hierro en figura de bocado; y de una yegua cruzada de la misma ganadería de D. Vicente.

Mañana lunes sale para Madrid el director de este periódico D. Francisco de A. Darder, quien nos comunicará oportunamente cuantas noticias, referentes á las ferias y exposiciones que han de celebrarse en aquella villa en el presente mes, puedan ofrecer algun interés para nuestros abonados.

Uno de los hermosos caballos que, como saben ya nuestros lectores, llegaron á esta capital, procedentes de las ferias de Sevilla, con destino al Círculo ecuestre, falleció el jueves último á consecuencia de una fiebre tifoidea desarrollada en pocas horas.

Sensible ha sido, particularmente para los inteligentes, la pérdida de un animal que por sus especiales y excelentes condiciones era considerado por aquellos como una verdadera alhaja.

La Sociedad protectora de los animales de Turin, en la distribucion de recompensas á los beneméritos de la causa que defiende, acaba de conceder diploma de honor al fundador de la Sociedad protectora de esta ciudad y director de la Revista Zoológica Barcelonesa don Luis Cabello é Ibañez, y mencion honorífica al director de nuestra Revista don Francisco de A. Darder.

Es probable que el príncipe Rodolfo sea invitado á una cacería en Riofrio y que visite con tal motivo los deliciosos jardines de la Granja.

Segun un colega, el matador Salvador Sanchez (a) Frascuelo y los banderilleros Bienvenida y Corito, se hallan

sometidos á un proceso por desacato á la Autoridad en la corrida del domingo último.

Debe llegar pronto á Madrid una preciosa yegua que ha comprado en París el Sr. marqués de Villamejor al señor Debamarre, cuyo precio se eleva á 25,000 francos.

Ha comprado en Inglaterra el Sr. Garvey, rico extractor de vinos de Jerez, un caballo pura sangre, notable, que ha ganado allí una carrera, y cuyo precio asciende á 75,000 francos.

El Taltersall de Nueva-York ha sido destruido por un incendio, habiendo perecido 63 caballos.

El príncipe Rodolfo será obsequiado en Zaragoza con una gran pesquería, y en Sierra Nevada con una expedición de caza mayor.

La feria de Binéfar (Huesca) se ha visto este año muy concurrida, habiendo sido numerosas las transacciones que se han hecho en ganado mular y asnal.

Las carreras de caballos efectuadas el jueves último en Jerez de la Frontera, dieron el siguiente resultado:

Ganó la primera *Trovador*, propio del Sr. Davies.—En la segunda venció *Fate*, del Sr. Heredia.—En la tercera triunfó *Eclipse*, del Sr. Aladro.—En la cuarta fué una apuesta particular entre los dueños de *Baron* y *Belem*, siendo ganada por el primero, perteneciente al Sr. Aladro.—La quinta la ganó tambien *Fate*.—En la última triunfó *Il Barbiere*, del Sr. Davies.

La Biblioteca de Agricultura, Horticultura, Ganadería é industrias rurales acaba de enriquecerse con la nueva obra titulada *Ingerto, poda y formacion de los árboles y vides* por D. Diego Navarro y Soler.

Comprende las nociones indispensables de Botánica y Fisiología agrícolas, todos los procedimientos de multiplicación y propagación de los vegetales leñosos, la teoría y práctica del ingerto de los árboles y vides, trabajos sobre la poda y formación de toda clase de árboles y vides, y está ilustrado con 170 grabados intercalados.

Se vende á 10 reales en Madrid y 12 en provincias franco de porte, debiendo dirigirse á su autor, calle de Silva, 49, 1.º Madrid.

Las mas importantes exposiciones que se verificarán en el corriente año son las siguientes:

En Lóndres se celebrará una exposicion agrícola-internacional, inaugurándose el 30 de Junio y terminará el 6 de Julio; y otra en Junio, permanente, de artes, ciencias é industria.

En Cassel (Alemania), otra de máquinas é instrumentos de herrería, y concurso de herreros en el mes de Mayo.

En Teplitz (Austria), otra industrial y de artes antiguas, en Agosto.

En Cherburgo, otra industrial y artística el 17 de Agosto.

En Neubourg (Francia), otra de reses cebadas, el 6 de Abril.

En Lille, otra regional universal, que tendrá lugar el 25 de Mayo hasta el 2 de Junio.

En Sidney (Nueva Gales del Sur), otra universal, en Junio.

En Méjico, otra universal, el 31 de Diciembre.

Un alcalde trataba de justificar que uno de sus avecindados poseia lo bastante para atender á las obligaciones que pensaba contraer, puesto que aspiraba á casarse. El alcalde, en su certificación al gobernador de la provincia, decia: «Excmo. Sr.: F. N. tiene un burro, y la que va á ser su esposa, una burra. Al burro de F. N., como V. E. comprenderá, unido con la burra de la que va á ser su mujer.....»

Al llegar á esta parte proemial, el gobernador dijo al que leia la certificación:

—Basta..... que los casen, y agrégueseles el burro del alcalde.

La diputacion de Córdoba ha acordado que se celebre una esposicion de ganados, la cual tendrá lugar el 31 del actual. En este certámen se adjudicarán treinta y cuatro premios, es decir, ocho mas que en el año anterior, y habrá además un gran premio de honor.